

# 1. tipa cukura diabēta paškontroles dienasgrāmata

# Hipoglikēmijas simptomi

VIEGLA  
AIZKAITINĀMĪBA

SVĪŠANA

NESKAIDRA  
REDZE

REIBONIS

BADA SAJŪTA

GALVASSĀPES

BĀLUMS

PAĀTRINĀTA  
SIRDSDARBĪBA

ROKU UN KĀJU  
TRĪCĒŠANA

## Zems glikozes līmenis asinīs – HIPOGLIKĒMIJA<sup>1</sup>

**Hipoglikēmija** tiek definēta kā glikozes līmenis asinīs zem 3,9 mmol/l. Pazīmes un simptomi katram cilvēkam var būt atšķirīgi.

**Amerikas diabēta asociācija ir klasificējusi hipoglikēmiju trīs līmeņos:**

**Pirmais līmenis (viegls)** – glikozes rādījums <3,9 mmol/l un  $\geq 3,0$  mmol/l;

**Otrais līmenis (mērens)** – glikozes rādījums <3,0 mmol/l;

**Trešais līmenis (smags)** – smags gadījums, kam raksturīgas apziņas un/vai fiziskā stāvokļa izmaiņas, kuram nepieciešama citas personas palīdzība.

## Kāpēc rodas hipoglikēmija?

- Iemesli:**
- Par daudz insulīna
  - Uzņemto ogļhidrātu daudzums neatbilst ievadītajai insulīna devai
  - Fiziskā slodze nav saskaņota ar insulīna ievadi

## Ko darīt?

### 1. Apēdiet 15 g glikozes

5 glikozes tabletes VAI izdzeriet pusglāzi augļu sulas vai piena VAI apēdiet dažas cukuru saturošas konfektes vai cukura gabaliņus.

### 2. Pēc 15 minūtēm izmēriet glikozes līmeni asinīs.

Ja tas vēl aizvien ir zemāks par <3,9 mmol/l, atkārtojiet 1. punktā minētās darbības.

### 3. 30 min. laikā pēc simptomu izzušanas apēdiet, piem., sviestmaizi un izdzeriet glāzi piena.

### 4. Analizējiet iespējamās hipoglikēmijas iemeslus, lai novērstu līdzīgas situācijas atkārtošanos nākotnē.

Vārds, uzvārds

---

Adrese, telefons

---

---

---

---

Ārstējošais ārsts, telefons

---

---

Medikamenti, kurus lietoju diabēta ārstēšanai

---

---

---

---

## Uztura plāns (maizes vienību sadalījums)

Brokastis	2. brokastis	Pusdienas	Launags	Vakariņas	2. vakariņas

## Maizes vienības faktors (insulina daudzums uz 1 MV)


## Mana mērķa glikēmija

Pirms ēdienreizes	
2 stundas pēc ēdienreizes	
Pirms gulētiešanas	

## Mans insulīns

Ātras darbības	
Ilgstošas darbības	

# Insulina devu adaptācijas plāns

Datums \_\_\_\_\_

Insulins	Rīts	2. brokastis	Pusdienas	Launags	Vakars	Gulēt ejot plkst. ____
Ātras darbības						
Ilgstošas darbības						
Maizes vienības						
Maizes vienības faktors						
Insulīna korekcijas faktors						

## Augsta glikozes līmeņa asinīs korekcija ar īsas darbības insulīnu

Insulīns (Insulīna vienības)	Rīts	Pusdienas	Vakars	Pirms gulētiešanas naktī
Maksimālā korekcijas deva				

$$\frac{\text{esošais glikozes līmenis asinīs} - \text{mērķa glikozes līmenis asinīs}}{\text{insulīna korekcijas faktors}} = \text{korekcijas insulīna deva}$$

Mans piemērs: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_





Datums	Brokastis				2. brokastis			Pusdienas			Launags		
	GLIK.	MV	INS.		GLIK.	MV	INS.	GLIK.	MV	INS.	GLIK.	MV	INS.
			Ātras darb.	Ilgst. darb.									

GLIK. – glikozes līmenis asinīs, MV – maize vielība, INS. – insulīns, Ātras darb. - ātras darbības, Ilgst. darb. - ilgstošas darbības

















































## Glikozētais hemoglobīns (HbA<sub>1c</sub>) = vidējais glikozes līmenis asinīs 3 mēnešu laikā

HbA <sub>1c</sub> (%)	Glikoze (mmol/l)
14,5	20,5
14,0	19,7
13,5	18,9
13,0	18,1
12,5	17,3
12,0	16,5
11,5	15,7
11,0	14,9
10,5	14,1
10,0	13,3
9,5	12,5
9,0	11,7
8,5	10,9
8,0	10,1
7,5	9,3
7,0	8,5
6,5	7,7
6,0	7,0
5,5	6,2
5,0	5,4

Liels  
hipoglikēmiju  
risks

# Hiperglikēmijas simptomi

SLIKTA  
DŪŠA

MIEGAINĪBA

SLĀPES  
UN BIEŽA  
URINĒŠANA

NOGURUMS

## Augsts glikozes līmenis asinīs – HIPERGLIKĒMIJA<sup>1</sup>

- Iemesli:**
- Insulīna trūkums
  - Uzņemto ogļhidrātu daudzums neatbilst ievadītajai insulīna devai
  - Slimības, stress

### Ko darīt?

1. Izmēriet glikozes līmeni asinīs.
2. Ievadiet papildus īsas darbības insulīnu pēc sava individuālā insulīna dozēšanas plāna.
3. Ja glikozes līmenis asinīs atkārtoti virs 15-16 mmol/l, izmēriet ketonu līmeni asinīs/urīnā, konsultējieties ar diabēta aprūpes speciālistu!

**Atsauce:** 1. American Diabetes Association, Standarts of Medical care in Diabetes-2021. Diabetes Care 2021; 44 (Suppl.1):S73-S81.



# Digitāli pieejami informatīvi materiāli cukura diabēta pacientiem

Apmeklējiet [www.novonordisk.lv](http://www.novonordisk.lv) pacientiem veltīto sadaļu,  
lai apskatītu materiālus cukura diabēta pacientiem!

## **Noskatieties video:**

Pēdu kopšana

*Novo Nordisk* ierīču lietošanas tehnika

Glikēmijas paškontrole

## **Apskatei vai lejupielādei pieejamie materiāli:**

Diabēts un uzturs

Uztura ieteikumi cukura diabēta pacientiem

Diabēta dienasgrāmatas



Noskenējiet šo QR kodu  
ar savu viedtālruni, lai piekļūtu  
pacientu sadaļai mūsu mājaslapā!



Reklāmas devējs: Novo Nordisk Latvia SIA  
K. Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167,  
Latvija. Izstrādāts 2025. gada janvārī.  
[www.novonordisk.lv](http://www.novonordisk.lv) © Novo Nordisk A/S LV25DI00005.